

Lietošanas instrukcija

Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet visu lietošanas instrukciju.

SENSIVIT® acu pilieni, šķīdums

Ražotājs: UNIMED PHARMA Ltd., Bratislava, Slovākijas Republika

Sastāvs:

Aktīvā viela:

1 ml šķīduma satur 3 mg Karmelozes nātrija sāls.

Palīgvielas:

Alfa tocopheroli acetat (α tokoferola acetāts – E vitamīns), *Vitaminum A* (A vitamīns), *Benzalkonii chloridum* (benzalkonija hlorīds), *Natrii chloridum* (nātrija hlorīds), *Natrii tetraboras* (nātrija tetraborāts), *Polysorbatum 80* (polisorbāts 80), *Macrogolglyceroli hydroxystearas* (makrogola glicerīna hidroksistearāts), *Hydroxypropylbetadex* (hidroksipropilbetadeks), *Dinatrii edetas dihydricus* (dinātrija edetāta dihidrāts), *Aqua ad iniectabilia* (ūdens injekcijām).

Farmakoterapeitiskā grupa: oftalmoloģiski līdzekļi.

Īpašības: SENSIVIT® ir šķīdums ar nomierinošu un mitrinošu efektu. Stabilizē visus trīs acs virsmas asaru plēves slāņus. SENSIVIT® satur karmelozes nātrija sāli, kura, pateicoties tās īpašībām, uz radzenes un konjunktīvas virsmas veido pagaidu aizsargājošu plēvi, nodrošinot mitrinošo efektu. Tādejādi SENSIVIT® stabilizē asaru plēves ūdens kārtu. SENSIVIT® satur A vitamīnu, kurš veicina asaru plēves iekšējās mucīna kārtas veidošanos. Kopīgi ar E vitamīnu uzlabo radzenes un konjunktīvas barošanu. Pievienotās produkta palīgvielas veicina asaru plēves ārējās (lipīdu) kārtas uzturēšanu, kas darbojas pret ātru acs virsmas izžūšanu. Šī plānā asaru plēves kārtā stiprina vai aizstāj visas trīs kārtas. Tādejādi tiek ievērojami uzlabots asaru aizsargājošais efekts.

Indikācijas: SENSIVIT® lieto nepietiekamas asaru veidošanās un visu sausās acs sindroma formu gadījumos. SENSIVIT® var tikt lietots gadījumos, kad radzeni un konjunktīvu nepieciešams pārklāt ar aizsargājošu mitruma slāni.

Kontrindikācijas: SENSIVIT® nedrīkst lietot, ja acīm piemīt paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai kādu no preparāta palīgvielām. Preparātu nedrīkst lietot grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti. SENSIVIT® nav piemērots bērniem, kas jaunāki par diviem gadiem.

Nevēlamās blakusparādības: reti tūlīt pēc lietošanas var rasties neliela pārejoša dedzināšanas sajūta. Var rasties arī alerģiska reakcija. Ja novērojat šīs blakusparādības vai citas neparastas reakcijas, ziņojiet ārstējošam oftalmologam (acu ārstam).

Mijiedarbība: ja vienlaikus jālieto vēl citi acu pilieni, preparāts SENSIVIT® jālieto pēdējais un vismaz 5 minūtes pēc iepriekšējo acu pilieņu iepilināšanas. Pastāstiet oftalmologam (acu ārstam) par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, vai plānojat lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes. Ja lietojat jebkāda veida acu preparātus, par to piemērotību vienlaicīgai lietošanai konsultējieties ar oftalmologu (acu ārstu).

Devas un zāļu lietošanas veids: ja vien oftalmologs (acu ārsts) nav noteicis citādi, parasti lieto 1 pilienu 1-3 reizes dienā, iepilnot asaru maisiņā. Ja preparātu lieto bērniem, devu individuāli nosaka oftalmologs (acu ārsts).

Preparātu var lietot pieaugušie, pusaudži un bērni, kas vecāki par diviem gadiem.

Īpašs brīdinājums: tūlīt pēc preparāta lietošanas var būt grūtības fokusēt skatienu, tādēļ apm. 20 minūtes pēc zāļu lietošanas neiesaka vadīt transportlīdzekļus, apkalpot mehānismus vai strādāt augstumā.

Lietojot zāles, nedrīkst valkāt kontaktlēcas. Pirms zāļu iepilināšanas jāizņem cietās kontaktlēcas; atpakaļ tās var ievietot ne ātrāk kā 20 minūtes pēc zāļu lietošanas.

Lietojot parakstīto devu, pārdozēšanas iespēju var praktiski izslēgt.

Ja produktu nejauši ir lietojis bērns, sazinieties ar ārstu.

Lietošanas instrukcija:

Pēc atvēršanas preparāts paredzēts okulārai lietošanai.

Jānoskrūvē aizsargājošais vāciņš; pacients nedaudz atliec galvu atpakaļ, apgriez pudelīti ar augšu uz leju un, saspiežot plastmasas pudelīti, iepilina apakšējā konjunktīvas maisiņā vajadzīgo daudzumu pilienu. Pilinātāja gals nedrīkst saskarties ar aci vai plakstiņiem.

Visbeidzot, vāciņš cieši jāuzskrūvē atpakaļ, lai izvairītos no šķīduma inficēšanas. Pudelīte jāuzglabā vertikālā pozīcijā. Produktu nedrīkst lietot pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz iepakojuma. Atvērtu iepakojumu lietot ne ilgāk par 28 dienām.

Iepakojums: 1 x 10 ml.

Uzglabāšana: produktu uzglabāt līdz 25 °C temperatūrā. Neuzglabāt ledusskapi, nesasaldēt. Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!.

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums: 2009 g.jūnijs.



Oriešková 11, 821 05 Bratislava
Slovak Republic



Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs
Unimed Pharma Ltd.,
Orieškova 11, SK-82105 Bratislava
Slovākijas Republika